



GUÍA PARA EMPEZAR A HABLAR CON SU MÉDICO SOBRE RUCONEST

¿Por qué RUCONEST?

RUCONEST le brinda el alivio que necesita para sus síntomas, cuando lo necesita

RUCONEST es un inhibidor recombinante de la C1 esterasa, o INH-C1, indicado para el tratamiento de ataques agudos en pacientes adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH).

-  El 97% de las inflamaciones agudas se trataron satisfactoriamente con una sola dosis*
-  Está demostrado que alivia los síntomas **de manera rápida y fiable**
-  El alivio duró **como mínimo tres días**†
-  Diseño recombinante con **suministro fiable**
-  La alta dosis de INH-C1 **trata la causa por la que se origina el AEH**
-  **Apoyo de enfermería individualizado**

* Según quedó evidenciado en ensayos clínicos

† Según quedó evidenciado en una revisión de estudios que incluyó 68 pacientes (280 ataques)

¿Quiere hablar con alguien que actualmente está en tratamiento con RUCONEST?

Comuníquese con un Paciente a cargo de la presentación para conocer su experiencia con el AEH y RUCONEST en apenas unos sencillos pasos:

- 1** Regístrese en:
www.RuconestPatientConnections.com o llame al **1-855-415-7490**
 - Se le asignará un **Paciente a cargo de la presentación** según los temas que usted desee abordar
 - Se le darán opciones de horarios de llamada
- 2** Hable con el **Paciente a cargo de la presentación** que se le asignó en la fecha y el horario programados
- 3** Continúe la conversación durante una segunda o incluso tercera llamada con el **Paciente a cargo de la presentación**

Consulte la guía de conversación en la página siguiente

INDICACIÓN (USOS) DE RUCONEST

Ruconest es un medicamento inyectable que se utiliza para tratar los ataques de angioedema agudos en pacientes adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use RUCONEST si ha presentado reacciones de hipersensibilidad inmediatas y potencialmente mortales, incluida anafilaxia, a RUCONEST o a cualquier otro producto inhibidor de la C1 esterasa (INH-C1). Llame de inmediato a su profesional de

atención médica o al departamento de emergencias si presenta: sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho, coloración azul (en labios y encías), palpitaciones cardíacas, hinchazón, desvanecimiento, erupción o urticaria.

No use RUCONEST si tiene o sospecha que tiene alergia a los conejos o a los productos derivados del conejo. Si no tiene una alergia conocida a los conejos, no es necesario realizar una prueba.

Por favor, **haga clic aquí** para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información del producto para pacientes, y visite **www.ruconest.com**

Responda estas preguntas para prepararse para su próxima visita:

Contexto

- ¿Sabe qué tipo de AEH se le diagnosticó?
 Tipo 1 AEH con INH-C1 normal
 Tipo 2 No estoy seguro
- ¿Con qué frecuencia presenta síntomas de hinchazón a causa del AEH?
_____ veces por semana/mes/año
- ¿Cuántos de estos cuadros de hinchazón trata?
 Todos Algunos
 La mayoría Los trato rara vez o nunca
- ¿Con qué frecuencia tiene que tratar un cuadro de hinchazón más de una vez para que se resuelva por completo?
 _____ veces

Síntomas

- ¿Qué partes del cuerpo se le hinchan normalmente?
 Manos, piernas, pies Garganta (laringe)
 Rostro Pecho (vías respiratorias)
 Estómago (abdomen) Genitales
- ¿Advierte algún signo (pródromo) de que está a punto de sufrir un cuadro de hinchazón, como erupción o dolor de cabeza?
 Sí A veces
 No No estoy seguro

Tratamientos

- ¿Qué tipo de tratamiento recibe en este momento? (Consígnelos en los espacios provistos)
 Medicamento(s) para tratar la hinchazón cuando se produce

 Medicamento(s) para prevenir que se produzca la hinchazón

 No utilizo ningún medicamento
- Si tiene indicado un tratamiento para los cuadros de hinchazón cuando se producen, ¿cuánto tiempo pasa hasta que empieza a sentir alivio después de tratar la hinchazón?
 Lo noto inmediatamente Alrededor de 1 hora
 Entre 30 y 45 minutos 2 horas o más

Preguntas que cualquier persona que esté considerando RUCONEST debería plantear a su médico

- ¿RUCONEST es adecuado para mí?
- ¿En qué se diferencia RUCONEST de mi tratamiento actual?
- ¿Le parece que me vendría bien estar en contacto con un enfermero Defensor de pacientes de RUCONEST (RPA)?
- ¿De qué medios dispone RUCONEST SOLUTIONS™ para estar seguros de que no haya un vacío de tratamiento mientras espero recibir la cobertura del seguro médico?

Preguntas para mujeres con AEH

- ¿Utiliza anticonceptivos en este momento?
 No
 Sí
En caso afirmativo, consígnelos aquí y pregúntele a su médico cómo los diferentes anticonceptivos pueden influir en el AEH: _____

- ¿Le interesa saber cómo el AEH puede incidir en su intimidad y en la planificación familiar? ¿Tanto ahora como en el futuro?
 No
 Sí
En caso afirmativo, estas son algunas preguntas para hacerle a su médico:
 - ¿En qué sentido una vida sexual activa podría incidir en el AEH?
 - ¿Cómo podrían influir los anticonceptivos orales en los síntomas del AEH?
 - Si quedo embarazada, ¿qué debo saber sobre los tratamientos del AEH?
 - Si quedo embarazada, ¿podré seguir con mi tratamiento actual para el AEH?
 - ¿De qué manera podría afectar un embarazo al AEH?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

El uso de RUCONEST no está indicado en niños menores de 13 años de edad.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluida cualquier alergia conocida a los conejos. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier otro medicamento que esté tomando, ya que algunos medicamentos, tal como las píldoras anticonceptivas y determinados andrógenos, pueden aumentar el riesgo de problemas de coagulación. Informe también a su proveedor de atención médica si está embarazada, amamantando o si planea quedar embarazada.

RUCONEST no se ha evaluado en mujeres embarazadas ni en madres lactantes. Usted y su proveedor de atención médica decidirán si RUCONEST es adecuado para usted.

RUCONEST se disolverá en agua estéril y se le inyectará lentamente en una vena (inyección intravenosa).

Por favor, [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información del producto para pacientes, y visite www.ruconest.com

Los efectos secundarios más frecuentes que presentaron los pacientes durante los estudios clínicos incluyen: dolor de cabeza, náuseas y diarrea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RUCONEST.

Si cualquiera de los efectos secundarios se vuelve grave o si observa cualquier efecto secundario que no se menciona aquí, informe a su proveedor de atención médica o farmacéutico. También puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en su sitio web www.fda.gov/medwatch.

Para obtener información del producto, informes de acontecimientos adversos e informes de quejas del producto, llame al número de teléfono gratuito de Pharming en EE. UU.:

(844) 474-2764 Número corporativo principal

(800) 930-5221 Acontecimientos adversos, quejas del producto, información médica