

Cuando sufra un ataque de AEH...

Confíe en una terapia sin plasma



RUCONEST®

Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)



INDICACIÓN

RUCONEST® es un inhibidor de la esterasa C1 (recombinante) que se indica para el tratamiento de ataques agudos en pacientes adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH). No se estableció la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con AEH que sufren ataques laríngeos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RUCONEST® (inhibidor de la esterasa C1 [recombinante]) no es apto para todos. No use RUCONEST si tiene un historial conocido de alergia a los conejos o a los productos que contienen conejo. No use RUCONEST si tiene un historial de reacciones alérgicas inmediatas y potencialmente mortales a las preparaciones inhibidoras de la esterasa C1, incluida anafilaxia.

Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes páginas y la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Información sobre el producto para el paciente.



RUCONEST®

Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

Acerca del angioedema hereditario

PARA COMPRENDER EL AEH

Independientemente de que recién le hayan diagnosticado angioedema hereditario (AEH) o de que ya padezca esta enfermedad durante algún tiempo, es importante comprenderla y estar preparado para el próximo ataque.

El angioedema hereditario causa episodios repetidos de inflamación “inexplicable” que se pueden producir en cualquier momento y, prácticamente, en cualquier parte del cuerpo, incluidos las manos, los pies, el estómago, el rostro y la garganta. A menudo, estos ataques son dolorosos y afectan la vida cotidiana. Afortunadamente, existen tratamientos eficaces.

El angioedema hereditario no es una alergia sino una enfermedad hereditaria que también se puede producir sin historial familiar. Las personas con AEH, por lo general, sufren el primer ataque en los primeros años de vida y, con frecuencia, los síntomas aumentan en la pubertad. La causa del angioedema hereditario es la carencia de una proteína sanguínea llamada inhibidor de la esterasa C1 (INH C1) o el mal funcionamiento del INH C1. Esto previene la serie de eventos en el cuerpo que provocan los síntomas de un ataque.

APLIQUE TRATAMIENTO ANTE EL PRIMER SIGNO DE ATAQUE

Puesto que no se puede predecir el lugar, la duración y la gravedad de los ataques de AEH, es importante tratar todos los ataques lo antes posible.

Aprenda a reconocer los primeros signos de manifestación de un ataque. Estos varían de una persona a otra y pueden incluir fatiga, sarpullido, malestar estomacal, dolor muscular y articular, calambres, entumecimiento u hormigueo, y dolor de cabeza.

También puede llegar a reconocer algunos eventos como “desencadenantes” de un ataque. Estos incluyen ansiedad, estrés, lesiones menores, procedimientos dentales, medicamentos, infecciones y cambios hormonales, como los que se producen durante el embarazo o la menstruación.

TENGA UN PLAN

Además de conocer los síntomas de advertencia de un ataque inminente, debe contar con un plan de tratamiento para controlar cada ataque de AEH tan pronto se presente.

Trabaje junto con su proveedor de atención médica para asegurarse de contar con un plan de tratamiento, o con una terapia disponible en caso de sufrir un ataque de AEH.

Muchos tratamientos pueden ser administrados por el paciente o por su cuidador. Si cuenta con un plan eficaz, se sentirá preparado para manejar su próximo ataque de AEH.

¿Por qué RUCONEST?



El **ÚNICO** INH C1 **SIN PLASMA** que no presenta ningún riesgo de transmisión de virus humanos



Aproximadamente 9 de 10 personas necesitaron **UNA DOSIS**



ALIVIO RÁPIDO en un tiempo medio de 75 a 90 minutos



El alivio de los síntomas se mantuvo durante **AL MENOS 3 DÍAS** en el 93% de los ataques



SUMINISTRO CONFIABLE con una gran reserva

INDICACIÓN

RUCONEST® es un inhibidor de la esterasa C1 (recombinante) que se indica para el tratamiento de ataques agudos en pacientes adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH). No se estableció la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con AEH que sufren ataques laríngeos.

4

Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes páginas y la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Información sobre el producto para el paciente.

CÓMO COMENZAR

Después de que su proveedor de atención médica le entregue un formulario de inscripción de pacientes de RUCONEST SOLUTIONS, puede esperar:

- 1 Una llamada de bienvenida del gerente del enfermero a cargo del caso para revisar los servicios disponibles
- 2 Una prueba gratuita de RUCONEST^a y capacitación de administración disponible por parte del defensor de pacientes de RUCONEST
- 3 Coordinación de ayuda financiera y envíos continuos de la farmacia especializada
- 4 Apoyo continuo durante todo el curso del tratamiento

^aLos pacientes nuevos en el uso de RUCONEST pueden ser elegibles para recibir una prueba gratuita (hasta 4 viales o una dosis). El ofrecimiento de pruebas gratuitas está sujeto a modificación o cancelación en cualquier momento, con o sin aviso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Si experimenta ronchas, protuberancias elevadas de color rojo claro que producen picazón (urticaria), opresión en el pecho, sibilancias, presión arterial baja (hipotensión) y/o anafilaxia durante una inyección de RUCONEST, o después de esta, interrumpa el uso de RUCONEST y comuníquese con su médico de inmediato. Estos pueden ser signos y síntomas de reacciones alérgicas.

 **RUCONEST**[®]
Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

Aprenda a administrar RUCONEST

RUCONEST SOLUTIONS ofrece servicios para ayudarlo a comenzar



APOYO ESPECIALIZADO E INDIVIDUALIZADO

- ▶ Como paciente que recibe RUCONEST, usted es elegible para recibir una capacitación sobre cómo administrar el medicamento
- ▶ Las sesiones de capacitación están a cargo de enfermeros autorizados y se llevan a cabo según su conveniencia, en la comodidad de su hogar^a
- ▶ Usted y su cuidador pueden recibir todas las sesiones de capacitación que sean necesarias hasta que se sientan seguros con la administración
- ▶ Puede haber servicios de infusión disponibles a pedido durante un ataque

Sin importar cuál sea su pregunta, nuestro equipo de enfermeros especializados pueden ayudarlo a abordar sus necesidades de cobertura, acceso y educación.

^aDisponibilidad sujeta a su ubicación geográfica.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Productos similares a RUCONEST se han asociado con eventos tromboembólicos. Antes de usar RUCONEST, informe a su médico si tiene un catéter/dispositivo de acceso venoso permanente, historial de coágulos sanguíneos (trombosis), engrosamiento de las paredes de las arterias (ateroesclerosis), si usa anticonceptivos orales

6

Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes páginas y la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Información sobre el producto para el paciente.

con RUCONEST y apoyo continuo durante todo el curso del tratamiento



(es decir, estrógeno o progesterona) o si tiene un sobrepeso excesivo y dificultad significativa para moverse.

Si está embarazada, planea quedar embarazada o está lactando, consulte a su proveedor de atención médica antes de usar RUCONEST.

 **RUCONEST**[®]
Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

Recursos adicionales



SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

- Comuníquese con su proveedor de atención médica o con el gerente del enfermero a cargo del caso de RUCONEST
-



Llame a RUCONEST SOLUTIONS

Teléfono:

1-855-613-4HAE (4423)

Fax:

1-855-423-5757

Horario de atención:

de 8:00 A. M. a 8:00 P. M. hora del Este,
de lunes a viernes



Visite RUCONEST.COM

Visite estos sitios de apoyo a pacientes

haea.org

haei.org

angioedemacenter.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios más frecuentes de RUCONEST en estudios clínicos incluyen: dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Se ha informado anafilaxia como efecto secundario grave en estudios clínicos con RUCONEST.

8

Consulte la Información de seguridad importante en las siguientes páginas y la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Información sobre el producto para el paciente.

**RUCONEST
SOLUTIONS**

Expertise. Delivered personally.

1-855-613-4423

El programa de apoyo a pacientes de RUCONEST SOLUTIONS no pretende ser un reemplazo de la consulta habitual que usted o sus seres queridos le hagan a un profesional de atención médica en cuanto al manejo de su AEH y su tratamiento con RUCONEST.

 **RUCONEST**[®]
Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

INDICACIÓN

RUCONEST® es un inhibidor de la esterasa C1 (recombinante) que se indica para el tratamiento de ataques agudos en pacientes adultos y adolescentes con angioedema hereditario (AEH). No se estableció la eficacia en los estudios clínicos en los pacientes con AEH que sufren ataques laríngeos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

RUCONEST® (inhibidor de la esterasa C1 [recombinante]) no es apto para todos. No use RUCONEST si tiene antecedentes conocidos de alergia a los conejos o a los productos que contienen conejo. No use RUCONEST si tiene antecedentes de reacciones alérgicas inmediatas y potencialmente mortales a las preparaciones inhibitoras de la esterasa C1, incluida anafilaxia.

Si experimenta ronchas, protuberancias elevadas de color rojo claro que producen picazón (urticaria), opresión en el pecho, sibilancias, presión arterial baja (hipotensión) y/o anafilaxia durante una inyección de RUCONEST, o después de esta, interrumpa el uso de RUCONEST y comuníquese con su médico de inmediato. Estos pueden ser signos y síntomas de reacciones alérgicas.

Productos similares a RUCONEST se han asociado con eventos tromboembólicos. Antes de usar RUCONEST, informe a su médico si tiene un catéter/dispositivo de acceso venoso permanente, historial de coágulos sanguíneos (trombosis), engrosamiento de las paredes de las arterias (ateroesclerosis), si usa anticonceptivos orales (es decir, estrógeno o progesterona) o si tiene un sobrepeso excesivo y dificultad significativa para moverse.

Si está embarazada, planea quedar embarazada o está lactando, consulte a su proveedor de atención médica antes de usar RUCONEST.

Los efectos secundarios más frecuentes de RUCONEST en estudios clínicos incluyen: dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Se ha informado anafilaxia como efecto secundario grave en estudios clínicos con RUCONEST.

Se le recomienda informar a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Para obtener información sobre el producto, obtener informes de eventos adversos e informes de quejas sobre el producto, comuníquese con el número gratuito de Pharming, EE. UU.:

(844) 474-2764 Número corporativo principal

(800) 930-5221 Farmacovigilancia, quejas sobre el producto, información médica

Se adjunta Información de prescripción completa, incluida la Información sobre el producto para el paciente.

Consulte la Información de seguridad importante en el interior del envase y la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Información sobre el producto para el paciente.



Pharming



RUCONEST[®]
Inhibidor de la esterasa C1 (recombinante)

RUCONEST es una marca comercial registrada de Pharming Intellectual Property, NV.

© 2017 Pharming Group NV RUC.US.2017.0022 Impreso en EE. UU.